






# ENTRESTO® SUSTITUYE A ENALAPRIL O UN ARA II Y ES TAN FÁCIL DE UTILIZAR COMO CUALQUIERA DE ELLOS

1.2

TERAPIA ACTUAL DE LA IC	NUEVA TERAPIA PARA IC		
	Paso 1	Paso 2	Paso 3
<b>ENALAPRIL</b>	Suspender ENALAPRIL por un periodo de lavado de 36 hs. 	De una dosis alta de enalapril (<10 mg/día): Dosis inicial de ENTRESTO® de 100 mg dos veces al día  De una dosis baja de enalapril (≤10 mg/día): Dosis inicial de ENTRESTO® de 50 mg dos veces al día 	La dosis de ENTRESTO® debe duplicarse cada 2 a 4 semanas hasta la dosis objetivo de 200 mg dos veces al día, según sea tolerado por el paciente 
<b>Antagonista de los receptores de angiotensina (ara II)</b>	De una dosis alta de ARA II: Dosis inicial de ENTRESTO® de 100 mg dos veces al día  De una dosis baja de ARA II: Dosis inicial de ENTRESTO® de 50 mg dos veces al día 		
<b>NO ENALAPRIL ni ARA II</b> (que no estaban tomando en el presente enalapril ni ARA II)	Dosis inicial de ENTRESTO® de 50 mg dos veces al día 		



 **INSUFICIENCIA RENAL:** En insuficiencia renal leve y moderada ENTRESTO® no requiere ajuste de dosis. En insuficiencia renal crónica severa (<30ml/min) iniciar con ENTRESTO® 50 mg dos veces al día titulando la dosis terapéutica hasta 200 mg dos veces diario.

**Referencias:** 1. McMurray JIV, et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 2014 Sep 11;371(11):993-1004 2. Último prospecto aprobado por ANMAT. 3. Health-Related Quality of Life Outcomes2. Lewis EF et al. PARADIGM-HF HRQOL. CircHeartFail 2017 4. Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibition Compared With Enalapril on the Risk of Clinical Progression in Surviving Patients With Heart Failure, Packer

Material exclusivo del profesional médico y/o farmacéutico. prohibida su exhibición, entrega a pacientes, consumidores y/o al público en general.



Escanee el código para acceder a la información del producto, o solicítelo al 0800-777-1111

